

لاسوونہ - سوسائٹی برائے ترقی  
انسانی و قدرتی وسائل



## ٹماٹر کی کاشت اور نگہداشت

پراجیکٹ برائے

# زرعی بقائے حیات

www.lasoona.org

### کیڑے اور بیماری:-

ٹماٹر کے فصل پر چور کیڑا چوں کا جھلساؤ اور پھل کا گڑوان حملہ آور ہوتا ہے۔ ان پر قابو پانے کیڑے مار دو ایمارن بحساب 2 ملی لیٹر اور پھپھوند کش دو ایمیلیٹ بحساب 2 گرام فی لیٹر پانی سپرے کریں۔

### برداشت اور پیداوار:-

ٹماٹر کی اکثر اقسام میں پھل کی چٹائی پودوں کے کھیت میں منتقلی کے تقریباً 90 دن بعد شروع ہوتی ہے اور 45 سے 60 دن تک جاری رہتی ہے۔ چٹائی پھل پورا پکنے سے پہلے کرنا ضروری ہے تاکہ پھل دور دراز منڈیوں میں بغیر خراب ہوئے پہنچ سکیں۔ ٹماٹر کی پیداوار کا انحصار بہت سے عوامل پر ہے۔ تجرباتی طور پر زرعی تحقیقاتی مرکز کے شعبہ ہنریات نے 16 ٹن اوسط فی ایکڑ پیداوار حاصل کیا ہے۔ لیکن عام حالات میں ٹماٹر کی اوسط پیداوار تقریباً 3 تا 4 ٹن فی ایکڑ ہے۔



Federal Ministry  
for Economic Cooperation  
and Development

وفاقی وزارت مالی معاونت و ترقی - حکومت جرمنی

welt  
hunger  
hilfe  
german agr action

جرمن ایگرو ایکشن

پراجیکٹ آفس ہشام: +92-966-412977

پراجیکٹ آفس چین: +92-998-405142

لاسوونہ ہاؤس  
رائل کیمپس، مرغزار روڈ سید و شریف سوات  
Tel: +92-946-9240071, 9240072  
Fax: +92-946-721421  
Email: lasoona@brain.net.pk  
website: www.lasoona.org

designed by: Meraj Khan

ٹماٹر کی پیداوار اور ان کی نگہداشت

### پودوں کی کھیت میں منتقلی:-

تیار شدہ کھیت میں 100 سنٹی میٹر کے فاصلے پر پیٹریاں بنالیں۔ نالیوں میں پانی چھوڑ دیں اور پیری شام کے وقت منتقل کر دیں۔ جس دن پیری نکالنا ہو تو اسی روز صبح اس کو سیراب کر دیں تاکہ نکالنے کے وقت پودوں کی جڑیں زیادہ نہ ٹوٹیں۔ نکالنے کے فوراً بعد پودوں کو پیٹری کے ایک طرف تقریباً ایک فٹ (30 سنٹی میٹر) کے فاصلے پر لگائیں۔ 2-3 دن بعد پانی دوبارہ لگادیں۔ تاکہ پودے اچھی طرح جڑ پکڑ سکیں۔ 8-10 دن بعد نانے بھر لیں تاکہ پیداوار متاثر نہ ہو۔

### آپاشی:-

ابتدائی ایام میں چونکہ پودوں کی جڑیں زمین کی بالائی سطح میں ہوتی ہے اس لئے آپاشی کا وقت کم رکھیں۔ پودوں کے بڑے ہونے اور جڑوں کے گہرائی تک پھیلنے کے ساتھ ساتھ پانی کی مقدار اور آپاشی کا وقت بڑھادیں۔ ٹماٹر کی فصل رتیلی زمین میں لگایا ہو تو پانی دینے کا وقت کم کریں۔ کیونکہ اس میں پانی کو قائم رکھنے کی صلاحیت اچھی نہیں ہوتی۔



### گوڈی اور جڑی بوٹیوں کی تلفی:-

ٹماٹر کے فصل کو دو تین گوڈی دیکر جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جاسکتا ہے۔ آخری گوڈی کے ساتھ پودوں کو زیادہ مٹی چڑھادیں تاکہ پودے زیادہ جڑیں پھیلا کر زیادہ خوراک زمین سے حاصل کر سکیں۔ پودوں کو مٹی چڑھاتے وقت مٹی نالیوں سے نہ لیں بلکہ پیٹری کے خالی طرف سے لیں۔ تاکہ نالی میں زیادہ پانی نہ ٹھہر سکے ایسا فالٹو پانی بعد میں پودے خشک ہونے اور بیمار یا پھیلا نے کا باعث بنتا ہے۔

ٹماٹر کی پیداوار اور ان کی نگہداشت

## ٹماٹر کی کاشت اور نگہداشت

ٹماٹر سلطنت نباتات کے مشہور خاندان سالونیسی (Solanaceae) سے تعلق رکھتا ہے اور ملاکنڈ ڈویژن کا ایک اہم فصل شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سرحد کے ٹماٹر کے کل رقبے اور پیداوار کا تقریباً 60 فیصد اسی ڈویژن سے لیا جاتا ہے۔ سال کے دونوں موسموں یعنی خریف اور ربیع میں اسکی کاشت کی جاتی ہے۔ ٹماٹر سارا سال سالن، سلاد اور چٹنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں خوراک کی اجزاء حیاتین اے، سی، لوہا، کیلشیم اور فاسفورس کی وافر مقدار موجود ہے۔ جو کہ انسانی جسم کے نشوونما کیلئے ضروری ہیں۔ زمینداران گزارشات پر عمل کر کے اس نقد آور فصل سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

## آب و ہوا:-

ٹماٹر کی بہترین نشوونما کے لئے معتدل آب و ہوا درکار ہوتی ہے کم درجہ حرارت پر پودوں کی نشوونما رک جاتی ہے۔ اور گورا بھی اس فصل کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ٹماٹر کی فصل عام طور پر 18 تا 27 ڈگری سنٹی گریڈ اوسط درجہ حرارت پر اُگائی جاتی ہے۔

## اقسام:-

شعبہ سبزیات نے ٹماٹر کے مختلف اقسام پر تحقیقی کام کیا ہے۔ لیکن ان میں روما (Roma-VF) سن مرزانو (Sunmarzano) اور رایوگینڈ (Riogland) اچھے انواع ہیں۔ مختلف خصلتوں کو مد نظر رکھ کر روما (Roma) ایک بہتر قسم مانا جاتا ہے۔

## شرح تخم:-

عام حالات میں 200 گرام بیج 2-3 مرلہ زمین میں کھاریاں بنا کر ڈالنا چاہئے۔ کھاریاں سطح زمین سے تقریباً 6 انچ اُنچی بنائیں تاکہ فالتوں پانی کی نکاس آسان ہو۔ تخم 3 انچ فاصلے پر بنائے ہوئے نشانوں میں 1/2 انچ گہرا ڈالیں۔ اور اسکے اُپر چھانا ہوا پُرانی ڈھیرانی کھاد ڈالکر فوراً سے روزانہ شام کے وقت آبپاشی کرتے جائیں۔

## وقت کاشت (پنیری):-

ٹماٹر کے لئے وقت کاشت کا انحصار فصل کی نوعیت (ربیع اور خریف) پر ہوتا ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن میں عام طور پر فصل خریف کیلئے بیج مارچ اپریل میں کھاریوں میں ڈالا جاتا ہے۔ جبکہ

پودے اپریل مئی میں منتقل کئے جاتے ہیں۔ فصل ربیع کیلئے مخصوص علاقوں میں بیج عام طور پر ماہ جون یا ماہ جولائی میں ڈالا جاتا ہے۔ اسکے پودے جولائی اگست میں کھیت میں منتقل کئے جاتے ہیں۔ بے موسمی پیداوار کیلئے پلاسٹک کے چھوٹے ٹٹیل کے اندر میدانی علاقوں میں فروری کے آخر اور مارچ میں اُگایا جاسکتا ہے۔ اس موسم میں پنیری لگائے بغیر بھی ٹماٹر اُگائے جاسکتے ہیں۔ زمین اور کھادیں:-

ٹماٹر کے لئے وقت کاشت کا انحصار کم اور لمبی موسم کی دستیابی پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر موسم کم ہو یا اگلی فصل اُگانا مقصود ہو تو رتیلی اور ہلکی میرا زمین چننا چاہئے۔ کھادوں کا استعمال:-

زمین کی تیاری میں مندرجہ ذیل کھادیں فی ایکڑ کے حساب سے ڈالیں۔

1	گلی سرئی ڈھیرانی کھاد	2 ٹریکٹر زرالی
2	ڈی۔ اے۔ پی	2 بوری
3	پوناشیم سلفیٹ	2 بوری
4	یوریا	2 بوری

پودوں کی منتقلی کے ایک ماہ بعد 25 کلوگرام یوریا ڈالنا زیادہ پیداوار کا باعث بنتا ہے۔